

GlashVista®

次回来院予定日

_____ 月 日

_____ 月 日

_____ 月 日

Allergan
Aesthetics
an AbbVie company

2023年2月制作
JP-LAT-230001

GlashVista®

グラッシュビスタ®
外用液剤0.03%5mLを
お使いの方へ

もくじ

グラッシュビスタ®について	3
グラッシュビスタ®の効果	6
グラッシュビスタ®の使い方	7
グラッシュビスタ®使用にあたっての注意	12
その他	14

グラッシュビスタ®について

グラッシュビスタ®とは？

■ この薬は、上まつ毛の長さ、豊かさ(太さ)、濃さを改善する外用薬です。

・ただし、発毛可能な毛包もうほうが存在しない場合には本来の効果が得られないことがあります。

■ この薬は、しょう もう ひん もう しょう睫毛貧毛症しょうもうひんもうしょうの患者さんに処方されます。

・睫毛貧毛症とは、まつ毛が不足していたり、不十分であったりすることをいいます。

グラッシュビスタ®に含まれているのは？

販売名	グラッシュビスタ®外用液剤0.03%5mL Glash Vista® cutaneous solution 0.03%5mL
含有量	1mL中:0.3mg 5.0mL
有効成分	ピマトプロスト
添加物	ベンザルコニウム塩化物、塩化ナトリウム、 リン酸一水素ナトリウム・七水和物、クエン酸水和物、塩酸、 水酸化ナトリウム


グラッシュビスタ®の形状は？

溶液の色	無色澄明
容器の形状	 70日分 〈専用ブラシ140本添付〉

グラッシュビスタ®の効果

グラッシュビスタ®の効果は？

この薬は毎日塗布すると、まつ毛が長く、太く、濃くなることが期待できます。
また、使用を中止するとこの薬の使用前の状態に戻ります。



グラッシュビスタ®の使い方

グラッシュビスタ®を使う前に、確認すべきことは？

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にグラッシュビスタ®に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に伝えてください。
 - ・水晶体の無い人、眼内レンズを挿入している人
 - ・目の手術をした人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は原則として使用を避けてください。(動物実験で経口投与した場合に早産、流産や胎児死亡などが報告されています)
- 授乳中の婦人は使用を避けてください。やむを得ず使用する場合には授乳を中止してください(動物実験で母乳に移行することが報告されています)。
- 小児(15歳未満)に対する安全性は確立されていないので、なるべく使用を避けてください。
- 眼疾患または眼手術後で治療中の人は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- 高齢の人には、使用された経験が少ないため慎重に使う必要があります。
- 男性に使用された経験は限られています。

グラッシュビスタ®の使い方は？

この薬は上まつ毛の生え際に塗布して使用する外用薬です。

■ 使用量および回数は？

通常、使用する量および回数は、次のとおりです。

- ・片目ごとに、1日に1回1滴を専用のブラシに滴下し、上まつ毛の生え際に就寝前に塗布します。
- ・頻繁に塗布しても効果が促進されませんので、1日1回を超えて塗布しないでください。
- ・一度使用したブラシは廃棄してください。再使用はしないでください。

■ どのように使用するか？

- ・化粧を落として、洗顔後清潔な状態で使用してください。
- ・この薬をグラッシュビスタ®の使用法(P10、11)に記載された要領で、添付されている専用ブラシを用いて、上まつ毛の生え際に塗布します。

■ 使用中に気をつけることは？

- ・塗布したときに薬液が、上まつ毛の生え際以外についた場合は、ティッシュなど吸収性の素材ですぐにふき取るか、洗い流してください。
- ・一度使用したブラシは廃棄してください。片方のまつ毛の塗布が終わったら、新しいブラシを用い、もう片方の上まつ毛の生え際に同様に塗布してください。
- ・コンタクトレンズをつけている場合には、レンズを外してから塗布し、15分以上経過してからレンズをつけてください(コンタクトレンズが変色することがあります)。

■ 使用し忘れた場合は？

- ・片目ごとに、1回に2滴塗布したり、1日に2回塗布したりしてはいけません。

■ 多く使用した時(過量使用時)は？

- ・異常を感じたら、医師または薬剤師に連絡してください。

グラッシュビスタ®の使用法



STEP 1

ご使用前に


- グラッシュビスタ®は、夜、メイク落としと洗顔を済ませて清潔な状態にしてから使用します。コンタクトレンズは外してください。再装着は、本剤塗布15分以上経過後に行ってください。
- 下まぶたに塗布したり、直接眼に点眼しないでください。



STEP 2

ブラシの準備

- ブラシを容器から取り出します。ブラシの毛先には触らないようにしてください(必ず専用のブラシをお使いください)。
- ブラシを水平に持ち、ブラシの毛先部分にグラッシュビスタ®を1滴落とし、染み込ませます。



STEP 3

まつ毛の生え際へブラシで塗る

- 滴下後直ぐに、ブラシを使って、上まつ毛の生え際の部分を、目頭から目尻の方向へ丁寧に塗ります。下まつ毛には塗らないでください。
- 塗る時には、液が目の中に入らないように、下まぶたにつかないように気をつけてください。
- 塗布回数を増やしてもまつ毛の成長は促進されないで、1日1回を超えて塗布しないでください。



STEP 4

生え際以外についた液をふき取る

- 液が上まつ毛の生え際以外についた場合は、コットンやティッシュなどですぐに薬液をふき取るか、洗い流してください。



STEP 5

ブラシを捨てる

- 片方のまつ毛を塗り終えたら、その都度使用したブラシは捨てて、再使用しないでください。





片方を塗り終えたら、新しいブラシを容器から取り出し、もう片方の上まつ毛にも、STEP2からの手順で同じようにグラッシュビスタ®を塗ります。

グラッシュビスタ®使用にあたっての注意

グラッシュビスタ®の副作用は？

- メラニンの増加によりまぶたが黒ずむことがあります。また、目の周りが多毛になったりすることもあります。これらは、塗布を中止すると元にもどる可能性があります。
- この薬を使用する場合には、これらの症状について、医師、薬剤師などから十分説明を受けてください。また、まぶたの色調変化や、目の周りが多毛になることを防いだり、軽減したりするため、塗布後は目の周りについて薬をよくふき取るか、洗顔してください。
- まぶたのかゆみ、目がしみる、目のかゆみ、目の痛みなどの症状があらわれることがあります。このような自覚症状が持続する場合にはただちに受診してください。

- 特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。このような症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用 こうさいしき そ かじょう 虹彩色素過剰	主な自覚症状 黒目(虹彩)の色が濃くなる 〈この副作用は日本人を対象とした臨床試験では報告されていない〉
使用前	使用後・発症例
	
がんけんこうしん か 眼瞼溝深化	まぶたがくぼむ 〈この副作用は日本人を対象とした臨床試験では報告されていない〉
使用前	使用後・発症例
	

- その他、重大な副作用ではありませんが、^{がんけんしき そ ちんちやく}眼瞼色素沈着があらわれることがあります(眼の周りが黒ずむなどの症状があります)。このような自覚症状が持続する場合にはただちに受診してください。



その他

グラッシュビスタ®の保管方法は？

- ・直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

グラッシュビスタ®が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

グラッシュビスタ®についての お問い合わせ先は？

症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

病院・医院名

製造販売元：アラガン・ジャパン株式会社